

Patient Education

Printed on 2021-02-18

Amoxicillin and Clavulanate

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

فيما يُستخدم هذا العقار؟

يُستخدم هذا العقار لعلاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية.

ما الذي يجب أن أخبر به طبيبي قبل أن اتناول هذا العقار؟

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأموكسيسيلين أو كلافلانات البوتاسيوم أو أي مركب من مركبات البنسلين أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.
- إذا كنت مصابًا بحساسية تجاه هذا الدواء، أو أي مكون منه، أو أي دواء آخر، أو أطعمة، أو مواد أخرى. أخبر طبيبك بخصوص الحساسية، وبخصوص العلامات التي ظهرت عليك.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى.
- إذا تغير لون بشرتك إلى الأصفر أو شحوت من قبل من أعراض جانبية بالكبد أثناء تناول هذا الدواء.
- إذا كنت مصابًا بمرض كثرة الوحيدات الخمجية.
- إذا كنت تتناول عقار البروبيسيد.

هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيادلة الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي بعض الأشياء التي يلزم معرفتها أو فعلها أثناء تناولي لهذا العقار؟

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان المعالجين لك.
- نادراً ما حدثت آثار جانبية لحساسية سيئة للغاية ومميتة في بعض الأحيان. استشر طبيبك.
- توجه لفحص الدم إذا كنت تتناول هذا العقار لفترة طويلة. استشر طبيبك.
- قد يؤثر هذا العقار على بعض التحاليل المخبرية. أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك والعاملين في المختبر بأنك تتناول هذا العقار.
- إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم (داء السكري)، وتخضع لاختبارات لتقصي وجود السكر في البول، فاستشر طبيبك؛ لمعرفة الاختبارات الأمثل للاستخدام.
- إذا كنت تعاني من مرض الفينيل كيتون يوريا (PKU)، استشر طبيبك. بعض المنتجات تحتوي على فينيل ألانين.
- يُحظر الاستخدام لمدة أطول مما ذكرت التوجيهات. قد تحدث عدوى ثانية.
- حبوب منع حمل وغيرها من وسائل منع حمل الأخرى المعتمدة على الهرمونات قد لا يؤدي مفعوله لمنع الحمل. استخدم طريقة أخرى لمنع الحمل مثل الواقي الذكري، وذلك عند تناول هذا العقار.
- يجب إخطار طبيبك، إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، أو ترضعين رضاعة طبيعية. لا بد من التشاور بخصوص الفوائد، والمخاطر التي قد تتعرضين لها أنتِ والجنين.

ما هي بعض الأعراض الجانبية التي يلزم أن اتصل بطبيبي بشأنها على الفور؟

- تحذير/تنبيه:** على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:
- أعراض لرد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، أو الشرى، أو الحكة، أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى، أو صغير عند التنفس، أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو البلع أو الكلام، أو حدوث بحة غير عادية، أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
 - علامات وجود مشاكل الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العيون.
 - تهيج المهبل.

يُعد الإسهال شائعاً عند تناول المضادات الحيوية. نادراً ما تحدث حالة إسهال حادة، تُعرف بالإسهال المصاحب للمطثية العسيرة (CDAD). يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى مشكلة في الأمعاء تفضي إلى الوفاة. قد يحدث الإسهال المصاحب للمطثية العسيرة (CDAD) أثناء تناول المضادات الحيوية أو بعد أشهر قليلة من تناولها. اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت بألم في المعدة أو تقلصات أو إسهال شديد أو إسهال سائل أو براز مدمم. راجع طبيبك قبل علاج الإسهال.

قد يحدث تفاعل جلدي خطير (متلازمة ستيفنز جونسون/انحلال البشرة السمي). ويمكن أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة لا تزول بسهولة، ويؤدي أحياناً إلى الوفاة. ينبغي الحصول على المساعدة الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أعراض مثل احمرار الجلد أو تورمه أو تقرحه أو تقشره (يصاحب ذلك حمى أو من دون حمى)؛ أو احمرار العينين أو تهيجهما، أو قروح في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

بالنسبة للمرضى ممن يتناولون هذا العقار:

• الإسهال.

• اضطراب المعدة أو قيء.

الأطفال:

• الطفح الجلدي في منطقة ارتداء الحفاضات.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول العقار؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

الأقراص ممتدة المفعول:

• تناول القرص مع الطعام.

• تجنب تناول هذا العقار مع وجبات غنية بالدهون.

• قم بابتلاعها جرعة واحدة. لا تمضغ ولا تسحق.

• يمكن تقسيم بعض المستحضرات إلى نصفين. إذا لم تكن متأكدًا من إمكانية تقسيم هذا المستحضر إلى نصفين، فيرجى استشارة الطبيب.

• دوام على استخدام هذا العقار بالطريقة التي أخبر بها الطبيب أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية، حتى وإن كنت تشعر أنك في حالة جيدة.

كافة الأشكال الأخرى:

• تناول هذا العقار مع الطعام أو بدونه. تناول القرص مع الطعام إذا كان يتسبب في اضطراب المعدة.

• دوام على استخدام هذا العقار بالطريقة التي أخبر بها الطبيب أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية، حتى وإن كنت تشعر أنك في حالة جيدة.

الأقراص القابلة للمضغ:

• امضغ القرص كاملاً قبل ابتلاعه.

السائل (محلول معلق):

• رج جيداً قبل الاستعمال.

• قس جرعات السائل بدقة. استخدم جهاز القياس المرفق بهذا العقار. وفي حالة عدم وجود الجهاز، أطلب من الصيدلي الحصول على جهاز لقياس العقار.

ما الذي يجب أن أفعله إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.

• إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدك العادية.

• يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف أأخذ هذا العقار و/أو أتخلص منه؟

السائل (محلول معلق):

• احفظ السائل (المعلق) في الثلاجة. يحظر التجميد. تخلص من أي كمية غير مستخدمة بعد مرور 10 يومًا.

• بالنسبة لبعض منتجات الأدوية، قد تكون تغييرات اللون أمراً طبيعياً يحدث أثناء التخزين. إذا لم تكن متأكدًا حيال ذلك الأمر، فاستشر الصيدلاني.

كافة الأشكال الأخرى:

• يُخزن في درجة حرارة الغرفة.

• احفظ العقار في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.

جميع الأشكال:

- احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- تخلص من العقاقير غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية. لا تشطف المرحاض بدفق الماء أو تفرغ الصرف ما لم يُطلب منك ذلك. استشر الصيدلي إذا كانت لديك أسئلة حول أفضل طريقة للتخلص من العقاقير. قد توجد برامج لاسترداد العقاقير في منطقتك.

حقائق عامة عن العقار

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.
- بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدّمي الرعاية الصحية.
- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإبلاغ عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.



حقوق التأليف والنشر © 2021 مملوكة لشركة UpToDate, Inc. والشركات التابعة لها و/أو مانحي التراخيص. جميع الحقوق محفوظة.