

Patient Education

Printed on 2021-02-18

(Diclofenac (Systemic

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

تحذير

قد يزيد هذا العقار من خطر الإصابة بمشكلات في القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات والسكنات القلبية. قد تكون هذه التأثيرات فاتلة. قد تزداد الخطورة إذا كنت تعاني من مرض بالقلب أو إذا كنت عرضة للإصابة بالأمراض القلبية. مع ذلك، فمن الممكن أن تزداد الخطورة أيضاً حتى لو كنت لا تعاني من مرض بالقلب أو لست عرضة للإصابة بالأمراض القلبية. قد تحدث هذه المخاطر خلال الأسبوع الأولى من استخدام هذا العقار، وقد تكون أكبر كلما زادت الجرعة المستخدمة أو طالت مدة استخدام العقار. يُحظر استخدام هذا العقار قبل إجراء جراحة قلبية أو بعدها مباشرةً.

قد يزيد هذا العقار من فرصة الإصابة بمشاكل خطيرة وفي بعض الأحيان مميتة، تصيب المعدة أو الأمعاء، مثل القرح أو النزيف. يزداد الخطير أيضاً لدى كبار السن والأشخاص الذين عانوا من قرح أو نزيف في المعدة أو الأمعاء قبل ذلك. قد تحدث هذه المشكلات دون أن تظهر أعراض تحذيرية.

فيما يستخدم هذا العقار؟

- يستخدم هذا العقار لتخفيف الألم.
- يستخدم هذا الدواء لعلاج بعض أنواع التهاب المفاصل.
- يستخدم هذا العقار لتخفيف الألم المصاحب للدورة الشهرية.
- يستخدم هذا العقار لعلاج حالات الصداع النصفي.
- وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يرجى استشارة الطبيب.

ما الذي يجب أن أخبر به طبيبي قبل أن اتناول هذا العقار؟

إذا كنت مصاباً بحساسية تجاه هذا الدواء، أو أي مكون منه، أو أي دواء آخر، أو أطعمة، أو مواد أخرى. أخبر طبيبك بخصوص الحساسية، وبخصوص العلامات التي ظهرت عليك.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الاستيرويدية (NSAID)، مثل إيبوبروفين أو نابروكسين.

إذا كنت قد عانيت مسبقاً من الربو بسبب عقار يحتوي على الساليسيلات مثل الأسبرين أو عقار كهذا العقار مثل العقاقير المضادة للالتهاب غير الاستيرويدية (NSAID).

إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الصحية التالية: نزيف معدى معوي أو مشكلات في الكلى.

إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الصحية الآتية: قصور القلب (ضعف القلب) أو نوبة قلبية حديثة.

إذا كنت تستخدم دواء آخر من مضادات الالتهاب اللستيرويدية (NSAID)، أو أحد أدوية الساليسيلات مثل الأسبرين، أو دواء بيميتريكسيد.

إذا كنت تواجهين صعوبة في الحمل أو تجرين فحص الخصوبة.

إذا كنت حاملاً، أو قد تصبحين حاملاً. يجب تجنب تناول هذا العقار في الأسبوع الـ 20 من فترة الحمل أو ما بعده ما لم ينصح طبيبك بخلاف ذلك. لا تتناولى هذا العقار إذا كان عمر حملك يزيد عن 30 أسبوعاً.

هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صررت بوصفة طيبة أو العقاقير المتاحة دون وصفة طيبة أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي بعض الأشياء التي يلزمني معرفتها أو فعلها أثناء تناولي لهذا العقار؟

أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بذلك تناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

توجه لفحص الدم إذا كنت تتناول هذا العقار لفترة طويلة. استشر طبيبك.

حدثت حالات ارتفاع في ضغط الدم عند استخدام عقارات مماثلة لهذا العقار. قم بعمل فحوصات لضغط الدم حسب تعليمات الطبيب.

أخبر الطبيب قبل تعاطي الكحول.

إذا كنت من المدخنين، فاستشر أخصائي الرعاية الطبية.

إذا كنت تعاني من داء الربو، فاستشر أخصائي الرعاية الطبية. قد تكون حساساً بدرجة أكبر تجاه هذا الدواء.

لا تتناول أكثر من الجرعة التي وصفها الطبيب. إن تناول كمية أكبر من الكمية الموصوفة قد يزيد احتمال إصابتك بآثار جانبية خطيرة.
يُحظر تناول هذا العقار لفترة أطول من التي حدها طبيبك.

قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصًا، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكينة حلاقة كهربائية.
يرتفع احتمال الإصابة بقصور القلب عند استخدام عقاقير مماثلة لهذا العقار. ترتفع احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية والوفاة الحاجة إلى العلاج بالمستشفى لدى الأشخاص الذين يعانون بالأصل من قصور في القلب. استشر الطبيب.

عقب الإصابة بأزمة قلبية حديثة، ترتفع احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية والوفاة الناجمة عن مشاكل القلب لدى هؤلاء الذين يتعاطون عقاقير مشابهة لهذا العقار. الأشخاص الذين يتناولون عقاقير مماثلة لهذا العقار كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال العام الذي أعقب إصابتهم بأزمة قلبية للمرة الأولى وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون عقاقير مماثلة لهذا العقار. استشر الطبيب.

إذا كنت تتناول الأسبرين للوقاية من الأزمة القلبية، فتحتاج إلى طبيبك في هذا الأمر.

إذا كنت تعاني من مرض الفينيل كيتون يوريا (PKU)، استشر طبيبك. بعض المنتجات تحتوي على فينيلalanine.
حدثت مشكلات في الكبد أثناء تناول عقاقير لهذا العقار. وكانت في بعض الأحيان مميتة. اتصل بطبيبك فورًا عند ظهور أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو أصفرار لون الجلد أو العينين.

حدث رد فعل خطير، ومميت في بعض الأحيان مع أدوية شبيهة بهذا الدواء. في أغلب الأحوال، يكون لرد الفعل هذا أعراض مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو تورم الغدد مع مشكلات في أعضاء الجسم مثل الكبد أو الكلية أو الدم أو القلب أو العضلات والمفاصل أو الرئة. استشر الطبيب إذا كانت لديك أسلنة.

إذا كنت تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، فيرجى توخي الحذر عند استخدام هذا العقار. قد تظهر لديك مزيد من الأعراض الجانبية.
قد تؤثر العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) مثل هذا العقار على إطلاق البوصات (الإياسة) لدى المرأة، يمكن لهذا أن يتسبب في عدم قدرتك على الحمل. يعود الجسم لحالته الطبيعية عند التوقف عن تناول هذا العقار. لذا تحذّي إلى طبيبك في هذا الأمر.

قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل. وإذا كنت حاملاً أو أصبحت حاملاً أثناء تناول هذا العقار، اتصل بطبيبك على الفور.

يجب إخبار طبيبك، إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية. لابد من التشاور بخصوص أي مخاطر قد يتعرض لها طفلك.

ما هي بعض الأعراض الجانبية التي يلزم أن اتصل بطبيبي بشأنها على الفور؟

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• أعراض لرد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، أو الشرى، أو الحكة، أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقرّرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى، أو صفير عند التنفس، أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو البلع أو الكلام، أو حدوث بحة غير عادية، أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض نزيف مثل قيء دم أو خروج دم مع السعال أو قيء يشبه نفل القهوة؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطراني؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهبلي غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف لا يمكنك إيقافه.

• أعراض مشاكل الكلية مثل عدم القدرة على التبول أو تغير في كمية البول أو وجود دم في البول أو زيادة كبيرة في الوزن.
• أعراض ارتفاع مستويات البوتاسيوم مثل عدم انتظام نبض القلب؛ أو الشعور بالارتباك؛ أو الشعور بالضعف أو تشوش الذهن أو انعدام التركيز؛ أو الشعور بأنه قد يُغمى عليك؛ أو التتميل أو الوخذ؛ أو ضيق النفس.

• أعراض ارتفاع ضغط الدم مثل الشعور بصداع حاد أو دوار أو إغماء أو تغيير في الإبصار.
• ضيق التنفس أو زيادة كبيرة في الوزن أو تورم في الذراعين أو الساقين.

• ألم أو ضعف في الصدر أو نساعر في ضربات القلب.

• الضعف في جانب واحد من الجسم، أو صعوبة في الكلام أو التفكير، أو تغير في الاتزان، أو تهدل أحد جانبي الوجه، أو عدم وضوح الرؤية.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• ألم عند التبول أو بول مصحوب بدم.

• غدة متضخمة.

قد يحدث تفاعل جلدي خطير (متلازمة ستيفنز جونسون/انحلال البشرة السمي). ويمكن أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة لا تزول بسهولة، ويعود أحياناً إلى الوفاة. ينبغي الحصول على المساعدة الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أعراض مثل احمرار الجلد أو تورمه أو تقرّرها أو تقرّرها (صاحب ذلك حمى أو من دون حمى)؛ أو احمرار العينين أو تهيجهما، أو قروح في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

جميع المنتجات التي تؤخذ بالفم:

• إمساك، أو إسهال، أو ألم المعدة، أو اضطراب المعدة، أو القيء.

• حرقة في المعدة.

- الغازات.
- الشعور بدوار أو بنعاس.
- الصداع.
- عرق شديد.
- أعراض نزلات البرد الشائعة.

الحقن:

- ألم في موضع الحقن.
- دوار أو صداع.
- الغثيان.
- الإمساك.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المنشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول العقار؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

الأقراص والكابسولات:

قد لا تعمل بعض المنتجات بالفعالية المتوقعة إذا تم تناولها مع الوجبات. تأكد أنك تعلم جيداً متى يتوجب عليك تناول هذا الدواء بالنسبة لمواعيد الطعام. قم باستشارة الطبيب أو الصيادي إذا لم تكن متأكداً.

- عليك تناول هذا العقار مع كوب كامل من الماء.

الأدوية ممتدة المفعول:

- تبليغ بأكمتها. تجنب المرضع أو الكسر أو السحق.

من خلال أكياس:

- إذا تناولت هذا العقار مع الطعام فقد لا يؤدي مفعوله كذلك. استشر طبيبك.

أفرغ محتويات العبوة في 2 إلى 4 ملاعق كبيرة (30 إلى 60 مل) من الماء وامزجه جيداً، ثم اشربه على الفور.

الحقن:

- يعطى العقار كحقنة في الوريد.

ما الذي يجب أن أفعله إذا فاتتني إحدى الجرعات؟**الأقراص والكابسولات:**

- تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.

إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيده العادلة.

- يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

من خلال أكياس:

- لا تحتاج إلا لجرعة واحدة فقط من هذا العقار. إذا فاتتك الجرعة، تناولها فور أن تتذكرها.

الحقن:

- اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتبعك عليك فعله.

كيف أخزن هذا العقار وأتخلص منه؟**جميع المنتجات التي تخزن بالفم:**

- يُخزن في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.

الحقن:

إذا كنت تريدين تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيادي حول كيفية تخزينه.

جميع الأشكال:

احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

تخليص من العقاقير غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية. لا تشنطف المرحاض بدفع الماء أو تفرغ الصرف ما لم يُطلب منك ذلك. استشر الصيادي إذا كانت لديك أي أسئلة حول أفضل طريقة للتخلص من العقاقير. قد توجد برامج لاسترداد العقاقير في منطقتك.

حقائق عامة عن العقار

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميتها ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغير ضرورة تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً معينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو النصائح أو المخاطر المحتملة التي قد تتطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.



حقوق التأليف والنشر © 2021 مملوكة لشركة UpToDate, Inc. والشركات التابعة لها و/أو مانحي التراخيص. جميع الحقوق محفوظة.